


พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับ การกระทำรุนแรงของสามีต่อภรรยา

พงษ์เดช สารการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


การสำรวจข้อมูลและงานวิจัยในบางกลุ่มของประเทศ



สภาพความเป็นจริง
ที่ปรากฏ



งานวิจัยใน
ต่างประเทศ



การบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์เป็นสาเหตุของการ
กระทำความรุนแรงในครอบครัว
โดยเฉพาะสามีกระทำต่อภรรยา



ผลลัพธ์ที่ได้ของประเทศยังขาดน้ำหนัก
จากผลการวิจัยบางรูปแบบ (Design) มารองรับ

การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับ การกระทำความรุนแรงของสามีต่อภรรยา



คำถามวิจัย

- **การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์** มีความสัมพันธ์กับการกระทำความรุนแรงของสามีต่อภรรยาหรือไม่ ?
- **พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์** มีความสัมพันธ์กับการกระทำความรุนแรงของสามีต่อภรรยาหรือไม่ ?




รูปแบบการวิจัย

แบบจับคู่ชนิดย้อนหลัง (matched case-control study)

ประชากร

สตรีที่มารับการตรวจรักษาในโรงพยาบาลขอนแก่น
และได้รับการให้คำปรึกษาจากศูนย์คุ้มครองเด็ก
และสตรีโรงพยาบาลขอนแก่นในระหว่างเดือน
มกราคม 2549 - ธันวาคม 2549 (1 ปี)

ตัวอย่าง



กลุ่มศึกษา

1. สตรีที่ถูกกระทำความรุนแรงจากสามีทั้งด้านร่างกาย เพศ/จิตใจ
2. มีสาเหตุ หรือแรงกระตุ้นจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
3. มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และเป็นผู้ที่ยินยอมให้ข้อมูลกับโครงการวิจัย
4. มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดขอนแก่น

กลุ่มควบคุม

1. สตรีที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เดียวกันกับกลุ่มที่ศึกษา
2. มีอายุมากกว่า หรือน้อยกว่าอายุของกลุ่มศึกษาไม่เกิน 5 ปี
3. ไม่เคยถูกกระทำความรุนแรงจากสามี หรือบุคคลภายในครอบครัวทั้งด้านร่างกาย เพศหรือจิตใจมาก่อน

ผลการศึกษา

การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีความสัมพันธ์กับการ
กระทำความรุนแรงของสามีต่อภรรยาหรือไม่ ?

สามีดื่มฝ่ายเดียว

≈ 4.27 เท่า

สามีและภรรยาดื่ม
ด้วยกันทั้งคู่

≈ 8.55 เท่า

การกระทำความ
รุนแรงของสามี
ต่อภรรยา

พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือ มีความสัมพันธ์กับการกระทำความรุนแรงของสามีต่อภรรยาหรือไม่ ?

ปริมาณการดื่มมากกว่า 5
แก้วขึ้นไปต่อครั้ง

≈ 4.17 เท่า

การใช้สารเสพติดร่วม
ขณะดื่ม

≈ 3.97 เท่า

การกระทำความ
รุนแรงของสามี
ต่อภรรยา

สรุปผลและวิจารณ์

สามีดัมฝ่ายเดียว

สามีและภรรยาดัม
ด้วยกันทั้งคู่

ดัมมากกว่า 5 แก้ว/ครั้ง

ใช้สารเสพติดร่วม
ขณะดัม

ปัจจัยกระตุ้น


ปัจจัยเสริม

มีความกล้าแสดงออกและกระทำการต่าง ๆ ทั้งในด้านดี และไม่ดี
ต่อบุคคลรอบข้าง

การกระทำความรุนแรงของสามีต่อภรรยา


การนำข้อค้นพบไปใช้ประโยชน์

1. เป็นการยืนยันข้อมูลว่า การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีความสัมพันธ์กับการกระทำความรุนแรงของสามีต่อภรรยา



การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสามี เป็น **ปัจจัยกระตุ้น** สำคัญที่ส่งผลให้เกิดการกระทำความรุนแรงของสามีต่อภรรยา และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น เมื่อมีการดื่มทั้งสามีและภรรยา

②. พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีความสัมพันธ์กับการกระทำความรุนแรงของสามีต่อภรรยา ได้แก่ ปริมาณการดื่มที่มากกว่า 5 แก้วต่อครั้งและการใช้สารเสพติดร่วมขณะดื่ม



ปริมาณการดื่มที่มากและมีการใช้สารเสพติดร่วมขณะดื่มจะเป็น **ปัจจัยเสริม** สำคัญที่เร่งให้มีโอกาสในการเกิดการกระทำความรุนแรงของสามีต่อภรรยาเพิ่มมากขึ้น